

Información de operación y formulario de consentimiento

Nombre: _____

Nacimiento: _____

Intervención planificada:

- Extracción de un nevo (marca de nacimiento) División de abscesos
- Escisión de una uña (plástico Emmert)
- desbridamiento de heridas extracción de cuerpos extraños
- Otra intervención: _____

Se planea una pequeña intervención quirúrgica para usted. En general, la frecuencia de complicaciones graves de estas intervenciones es muy baja.

Complicaciones generales de la anestesia local:

Dependiendo del procedimiento, se le administrará anestesia local. Se inyecta un anestésico local en el área de la piel circundante para reducir o eliminar el dolor.

La anestesia de conducción (anestesia Oberst) se lleva a cabo para intervenciones en los dedos de manos y pies:

En la base de los dedos de manos y pies, se inyectan unos pocos mililitros de anestésico local con una cánula delgada al nivel de las articulaciones básicas, tanto en el lado de la superficie de la mano / pie como en los pares de nervios hacia la parte posterior de la mano / pie. Al desconectar estos cuatro nervios, el entumecimiento del dedo de la mano o del pie se completa después de unos cinco a diez minutos.

Las complicaciones especiales de la anestesia local son:

Sensación de tensión, dolor leve (después de que el anestésico ha disminuido su efecto) y pequeños hematomas en el sitio de punción, que son inofensivos y generalmente no requieren tratamiento;

muy raramente daño en la piel, tejidos blandos o nervios (por ejemplo, absceso de jeringa, necrose del tejido) en el sitio de punción de la anestesia local. Por lo general, retroceden solos o son fáciles de tratar. Bajo ciertas circunstancias puede haber quejas permanentes (por ejemplo, dolor, molestias).

Complicaciones generales del procedimiento quirúrgico:

Como con cualquier procedimiento quirúrgico, puede haber:

Sangrado, nuevas hemorragias, trastornos de curación de heridas, infecciones de heridas (tejidos blandos, huesos, médula ósea) y lesiones de tejidos blandos. Los tratamientos de seguimiento con antibióticos, enjuagues o cirugía de seguimiento pueden ser necesarios.

El cumplimiento de los exámenes de seguimiento acordados puede permitir la detección temprana de infecciones.

Eliminación de una marca de nacimiento (nevo)

Si hay una sospecha de crecimiento maligno de la piel, se retira el área sospechosa de la piel para un diagnóstico posterior y se envía a un laboratorio para un examen histológico.

Después de cortar, la herida se cose con uno o dos puntos para cerrar el corte nuevamente. Dependiendo de la técnica de sutura aplicada y la localización, aparecen cicatrices más grandes o más pequeñas.

Las complicaciones especiales de la extracción del nevo son:

Cicatrización, dehiscencia de sutura (apertura de los bordes de la herida), dispersión de tejido local.

Escisión de cuña de uñas

La escisión de la cuña de la uña, (plástica Emmert), se usa para la uña encarnada. Bajo anestesia local, se extrae una parte en forma de cuña de la uña del pie o la uña afectada junto con la parte asociada del lecho ungueal. La piel se corta paralelamente al lado largo de la uña y una cuña de tejido con la uña encarnada se retira. La herida solo se adapta, no se cose bien. La herida se cura sin ninguna otra medida bajo un vendaje estéril.

Este procedimiento reduce el tamaño del lecho ungueal, entre otras cosas, de modo que la uña del pie vuelve a crecer en una forma más estrecha y, por lo tanto, ya no corta la pared de la uña lateralmente. La curación completa lleva unas dos semanas. Durante este tiempo, la parte delantera del pie debe moverse lo menos posible.

Las complicaciones especiales de la escisión de la cuña de la uña incluyen: Cambio, retraso o ausencia de formación de uñas.

Declaración del paciente

Soy consciente de que un cambio o extensión de la medida planificada, que se ha discutido, puede resultar necesaria solo durante la intervención.

Declaro que he leído y entendido esta información. Me informaron verbalmente sobre el tipo, el propósito y el curso del procedimiento, así como sobre sus principales ventajas, desventajas y riesgos, también en comparación con otros métodos de tratamiento y al abstenerme del procedimiento.

Mis preguntas han sido respondidas completamente, no quiero ninguna aclaración adicional. No tengo más preguntas y, después de un período de

deliberación, doy mi consentimiento libre para el tratamiento propuesto. Fui instruido sobre el comportamiento requerido antes y después del procedimiento.

Fecha de cirugía deseada: hoy cita renovada

Lugar, fecha, firma (paciente / padre / tutor legal *)

Firma del profesional

* Ambos padres o tutores deben firmar. Si solo uno de los padres firma, él / ella declara que él / ella actúa de acuerdo con el otro parent o que él / ella tiene la custodia exclusiva.

Comentarios médicos sobre la entrevista informativa.
(por ejemplo, riesgos individuales y posibles complicaciones, medidas auxiliares y de seguimiento, representación legal, caso de atención, representante autorizado)

Informações sobre operação e formulário de consentimento

Nome: _____

Nascimento: _____

Intervenção planejada:

- Extração de um nevo (marca de nascença) Divisão de abscessos
- Excisão de uma unha (plástico Emmert)
- Desbridamento de feridas Remoção de corpos estranhos
- Outra intervenção: _____

Uma pequena intervenção cirúrgica está planejada para si. Em geral, a frequência de complicações graves dessas intervenções é muito baixa.

Complicações gerais da anestesia local:

Dependendo do procedimento, receberá anestesia local. Um anestésico local é injetado na área circundante da pele para reduzir ou eliminar a dor.

A anestesia de condução (anestesia Oberst) é realizada para intervenções nos dedos das mãos e dos pés:

Na base dos dedos das mãos e dos pés, alguns mililitros de anestésico local são injetados com uma cânula fina no nível das articulações básicas, tanto no lado da superfície da mão / pé quanto nos pares de nervos que dorso da mão / pé.

Quando esses quatro nervos são desconectados, a dormência no dedo ou dedo do pé fica completa após cerca de cinco a dez minutos.

As complicações especiais da anestesia local são:

Sensação de tensão, dor leve (após o efeito anestésico ter diminuído) e pequenas contusões no local da punção, que são inofensivas e geralmente não requerem tratamento;

Muito raramente, danos à pele, tecidos moles ou nervos (por exemplo, abscesso na seringa, necrose do tecido) no local da punção da anestesia local. Eles geralmente desaparecem por si mesmos ou são fáceis de tratar. Sob certas circunstâncias, pode haver queixas permanentes (por exemplo, dor, desconforto).

Complicações gerais do procedimento cirúrgico:

Como em qualquer procedimento cirúrgico, pode haver:

Sangramento, ressangramento, distúrbios de cicatrização de feridas, infecções de feridas (tecidos moles, ossos, medula óssea) e lesões de tecidos moles.

Tratamentos antibióticos de acompanhamento, enxágue ou cirurgia de acompanhamento podem ser necessários.

A conformidade com os exames de acompanhamento acordados pode permitir a detecção precoce de infecções.

Remoção de uma marca de nascença (nevo)

Se houver suspeita de crescimento maligno na pele, a área suspeita da pele é removida para posterior diagnóstico e enviada ao laboratório para exame histológico.

Após o corte, a ferida é soturada com um ou dois pontos para fechar o corte novamente. Dependendo da técnica de sutura aplicada e da localização, cicatrizes maiores ou menores aparecem.

As complicações especiais da remoção de nevo são:

Cicatrizes, deiscência de sutura (abertura das bordas da ferida), dispersão do tecido local.

Excisão de cunha de unha

A excisão da cunha da unha (plástica Emmert) é usada para a unha encravada. Sob anestesia local, uma parte em forma de cunha da unha ou unha afetada é removida juntamente com a parte associada do leito da unha. A pele é cortada paralelamente ao lado mais comprido da unha e uma cunha de tecido com a unha encravada é removida. A ferida apenas se adapta, não se costura completamente. A ferida cicatriza sem qualquer outra medida sob um curativo estéril.

Esse procedimento reduz o tamanho do leito ungueal, entre outras coisas, para que a unha do pé fique mais estreita e, portanto, não corte mais a parede da unha lateralmente. A cura completa leva cerca de duas semanas. Durante esse período, a frente do pé deve se mover o menos possível.

As complicações especiais da excisão das unhas incluem:
Mudança, atraso ou ausência de formação de unha.

Declaração do paciente

Estou ciente de que uma alteração ou extensão da medida planejada, que foi discutida, pode ser necessária durante a intervenção.

Declaro que li e comprehendi esta informação. Fui informado verbalmente sobre o tipo, objetivo e curso do procedimento, bem como suas principais vantagens, desvantagens e riscos, também em comparação com outros métodos de tratamento e pela abstenção do procedimento.

As minhas perguntas foram totalmente respondidas, não necessito mais esclarecimentos. Não tenho mais perguntas e, após um período de deliberação, dou o meu consentimento livre para o tratamento proposto. Fui instruído sobre o comportamento necessário antes e após o procedimento.

Data da cirurgia desejada: hoje data renovado

Local, data, assinatura (paciente / pais / responsável legal *)

Assinatura do profissional

* Ambos os pais ou responsáveis devem assinar. Se apenas um dos pais assinar, ele / ela declara que age de acordo com o outro pai ou que ele / ela tem a guarda exclusiva.

Comentários médicos sobre a entrevista informativa.
(por exemplo, riscos individuais e possíveis complicações, medidas auxiliares e de acompanhamento, representação legal, caso de assistência, representante autorizado)